



شرکت دانش بنیان
مجمع شیمیایی
بیستون کرمانشاه
تولید کننده انواع آفت کش های کشاورزی

► **MOSHABAK**
Biseton Kermanshah Chemical Complex





شرکت دانش بنیان و فناوری مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه

تولید کننده انواع آفت کش های کشاورزی

► **MOSHABAK**
Biseton
Kermanshah
Chemical Complex

شرکت دانش بنیان و فناوری مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه

در سال ۱۳۷۰ به ثبت رسیده و در سال ۱۳۷۳ با احداث ساختمان ها و نصب تجهیزات تولیدات خود را در زمینی به مساحت ۱۷۸۰۰ متر، باغات و مزارع جهت آزمایش سموم به مساحت ۷۰۰۰۰ متر راه اندازی کرده و موفق به سنتز و تولید تکنیکال آفت کش کلریدازون به عنوان دومین تولید کننده در دنیا و همچنین تولید تکنیکال حشره کش پیری پروکسی فن گردید و فرمولاسیون انواع سموم در خطوط مختلف را به بهره برداری رساند و هم اکنون نیز تنها تولید کننده تکنیکال علف کش و حشره کش در ایران می باشد که با وجود مشکلات فراوان امولسی فایر های مورد نیاز خود را همچون قبل از تنسیوفیکس بلژیک استفاده می کند و دانش فنی بسیار بالای مهندسان مربوطه و خط تولید مدرن و استفاده از مواد اولیه درجه یک همان موضوعی است که کیفیت محصولات شرکت را بسیار زبان زد ساخته و همچنان کیفیت و رضایت مصرف کننده را سرلوحه خود می داند.





MOSHABAK

Biseton
Kermanshah
Chemical Complex

۱	۲۵	۳۱	۳۰	۲۴	۲۳
۸	۲۷	۷	۲۶	۶	۲۵
۱۵	۳	۱۴	۲	۲۱	۲۰
۲۲	۱۰	۱۱	۳۱	۲۹	۲۸
۲۱	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲
۲۹	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳



تنها تولید کننده تکنیکال پیری پروکسی فن در ایران
Particular producer of Technical grade Pyriproxifen in Iran

پیری پروکسی فن مشبک
PYRIPROXYFEN MOSHABAK
(EC 10%)

MOSHABAK
Bisefoon Kermanshah Chemical Complex

پیری پروکسی فن (EC 10%)

پیری پروکسی فن حشره کشی هورمونی است که با اختلال در فرایند تکامل و رشد لارو مانع تبدیل آن به حشره کامل شده و باعث مرگ آن میگردد. برای مبارزه با شپشک، سپردار و پسیل مرکبات و سفید بالک (عسلک) پنبه و توتون استفاده می گردد.

میزان مصرف	عنوان آفت	محصول
۷۵/۰ لیتر در هکتار	عسلک پنبه	پنبه
۵/۰-۷/۰ در هزار	پسیل و سفید بالک	مرکبات

Pyriproxifen (EC 10%)

Pyriproxifen is a hormonal insecticide killing insects by interfering in the growth and development process of larva and thus inhibiting its conversion to a full insect. It is used in citrus gardens and control of honeydews of cotton farms.

01

www.moshabak.co



شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
۱ ^{۲۶}	۲ ^{۲۷}	۳ ^{۲۸}	۴ ^{۲۹}	۵ ^{۳۰}	۶ ^{۳۱}	۷ ^۱
۸ ^۲	۹ ^۳	۱۰ ^۴	۱۱ ^۵	۱۲ ^۶	۱۳ ^۷	۱۴ ^۸
۱۵ ^۹	۱۶ ^{۱۰}	۱۷ ^{۱۱}	۱۸ ^{۱۲}	۱۹ ^{۱۳}	۲۰ ^{۱۴}	۲۱ ^{۱۵}
۲۲ ^{۱۶}	۲۳ ^{۱۷}	۲۴ ^{۱۸}	۲۵ ^{۱۹}	۲۶ ^{۲۰}	۲۷ ^{۲۱}	۲۸ ^{۲۲}



تتبا تولید کننده تکنیکال کلریدازون در ایران
Particular producer of Technical grade Chloridazone in Iran
کلریدازون مشبک
CHLORIDAZON MOSHABAK
(WP 65%)



کلریدازون (WP 65%)

کلریدازون علف کش سیستمیک و انتخابی علف هرز پهن برگ مزارع چغندر از گروه پیریدازینون می باشد که از طریق برگ و نیز ریشه جذب علف هرز شده و با ممانعت از عمل فتوسنتز باعث مرگ علف هرز میگردد.

محصول	عنوان آفت	میزان مصرف
چغندر قند	علف هرز پهن برگ	۴ کیلو در هکتار بیش از روش

Chloridazon (WP 65%)

Chloridazone is a choice systemic herbicide for control of broad leave weeds of beet farms from Pyridazinone group which is absorbed into the weeds through the leaves and root and causes death of the weeds by inhibiting photosynthesis.



۲ ^{۲۸}	۱ ^{۲۷}	۳۱ ^{۲۸}	
۹ ^{۲۹}	۸ ^{۲۸}	۷ ^{۲۷}	۶ ^{۲۶}
۱۶ ^{۳۰}	۱۵ ^{۲۹}	۱۴ ^{۳۱}	۱۳ ^{۳۰}
۲۳ ^{۳۱}	۲۲ ^{۳۰}	۲۱ ^{۲۹}	۲۰ ^{۲۸}
۳۰ ^{۳۱}	۲۹ ^{۳۰}	۲۸ ^{۲۹}	۲۷ ^{۲۸}



۹/۱ % فن مدیفام+۷/۱ % دس مدیفام
۱۱/۲ % اتوفومزیت EC (بتا مشبک)
PHENMEDIPHAM+DESMEDIPHAM+
ETHOFUMESATE (Beta moshabak)
(EC 27.4%)

MOSHABAK
Bisefoon Kermanshah Chemical Complex

فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومزیت (EC 27.4%)

علف کشی سیستمیک انتخابی و ترکیبی مزارع چغندر قند است که فن مدیفام و دس مدیفام از طریق اندام هوایی و اتوفومزیت از طریق برگ و ریشه علف هرز جذب میشود و طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ یکساله را کنترل میکند. اتوفومزیت با توقف ساخت چربی ها و دس مدیفام، فن مدیفام با اختلال در پروسه فتوسنتز باعث مرگ علفهای هرز می گردند.

میزان مصرف

۳ لیتر در هکتار

عنوان آفت

علف های هرز پهن برگ

محصول

چغندر قند

Phenmedipham+Desmedipham+Ethofumesate (EC 27.4%)

a choice combined systemic herbicide of beet farms of which phenmedipham and desmedipham are absorbed through the shoots and ethofumesate is absorbed through the leaves and roots of the weeds and in total control a broad spectrum of annual broad-leaf weeds. Ethofumesate interferes in construction of lipids and desmedipham and phenmedipham interfere in photosynthesis leading to the death of weeds.

03

www.moshabak.co



F_{26}^6 D_{25}^5 C_{24}^4 B_{23}^3 A_{22}^2 I_{21}^1
 I_{21}^{11} I_{22}^{12} I_{23}^{13} I_{24}^{14} I_{25}^{15} I_{26}^{16} I_{27}^{17}
 I_{28}^{18} I_{29}^{19} I_{30}^{20} I_{31}^{21} I_{32}^{22} I_{33}^{23} I_{34}^{24} I_{35}^{25} I_{36}^{26}



دلتا مشبک
DELTA MOSHABAK
(EC 2.5%)

MOSHABAK
Biseton Kermanshah Chemical Complex

دلتامترین (EC 2.5%)

دلتامترین حشره کشی گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و بسیار سریع اثر که از گروه پیروتروئیدی است که با مسدود کردن مسیر ورود سدیم به سلول های عصبی و اختلال در انتقال پالس ها در طول رشته عصبی، حشرات را از بین می برد. برای مبارزه با آفات سن مزارع گندم و پرودینا مزارع چغندر استفاده میگردد.

محصول	عنوان آفت	میزان مصرف
چقندر قند	پرودینا	۱ لیتر در هکتار
درختان میوه سردسیری	مینوز لکه گرد	۵/۰ در هزار
گندم	پوره سن	۳۰۰ سی سی در هکتار

Deltamethrin (EC 2.5%)

Deltamethrin is a very fast-acting non-systemic gastrointestinal insecticide from pyrethroid group which kills insects by blocking the entry of sodium into nerve cells and interfering in pulse transmission along the nerve fibers. It is used to control instars of wheat farms and common cutworms of beet farms.



۳۲	۲۲۳	۱۲۲							
۱۰۳۱	۹۳۰	۸۲۹	۷۲۸	۶۲۷	۵۲۶	۴۲۵			
۱۷۱۷	۱۶۱۶	۱۵۱۵	۱۴۱۴	۱۳۱۳	۱۲۱۲	۱۱۱۱			
۲۴۱۴	۲۳۱۳	۲۲۱۲	۲۱۱۱	۲۰۱۰	۱۹۹	۱۸۸			
۳۱۲۱	۳۰۲۰	۲۹۱۹	۲۸۱۸	۲۷۱۷	۲۶۱۶	۲۵۱۵			



کلودینامشبیک
CLODINA MOSHABAK
(EC 8%)



MOSHABAK
Bisefoon Kermanshah Chemical Complex

کلودینافوب پروپارژیل (EC 8%)

کلودینافوب پروپارژیل علف کشی انتخابی، سیستمیک مزارع گندم است که از طریق اندام هوایی و برگ گیاه جذب شده و بازدارنده آنزیم استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز میباشد که با اختلال در ساخت غشا، رشد ریشه و اندام هوایی در نهایت مرگ گیاه را موجب میشود.

میزان مصرف	عنوان آفت	محصول
۱-۸ / ه لیتر در هکتار	علف هرز کشیده برگ	گندم
۸ / ه لیتر در مرحله پنجه زنی	علفهای هرز نازک برگ	ترتیکاله

Clodinafop Propargyl (EC 8%)

Clodinafop Propargyl is the choice systemic herbicide of wheat farms which is absorbed through the shoots of herbal leaves and is an inhibitor of Acetyl Co-A Carboxylase causing death of the plant by interfering in construction of membranes and development of root and shoots.

05

www.moshabak.co



شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱
۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸
۲۹	۳۰	۳۱	۱	۲	۳	۴
۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵
۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۱



پروپارژیت مشبک
PROPARGITE MOSHABAK
(EC 57 %)

MOSHABAK
Bisefoon Kermanshah Chemical Complex

پروپارژیت (EC 57 %)

پروپارژیت کنه کش غیر سیستیمیک از گروه سولفیت با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی است.

میزان مصرف	عنوان آفت	محصول
۱/۵ لیتر در هکتار	کنه تارتن (عنکبوتی)	پنبه و سوجا
۱ لیتر در هکتار	کنه تارتن (عنکبوتی)	چغندر قند
۱ در هزار	کنه پسته	پسته
۲ در هزار	کنه تارتن، کنه دوتقه ای	حبوبات
۱/۲ در هزار	کنه قرمز پاکوتاه	چای
۱ در هزار	کنه قرمز اروپایی	به استثنای درختان میوه کلابی و به
۱ در هزار	کنه دو نقطه ای	درختان جنگلی و غیر متمر

Propargite (EC 57 %)

Propargite is acaricide of sulfite ester group, which gives effective control of many species of phytophagous mites (particularly motile stages) on a variety of crops, through its contact and fumigant action. Propargite is suitable for Integrated Pest Management.

06

www.moshabak.co



۴ ^{۲۵}	۳ ^{۲۴}	۲ ^{۲۳}	۱ ^{۲۲}						
۱۱ ^{۲۴}	۱۰ ^{۲۳}	۹ ^{۲۲}	۸ ^{۲۱}	۷ ^{۲۰}	۶ ^{۱۹}	۵ ^{۱۸}			
۱۸ ^{۲۱}	۱۷ ^{۲۰}	۱۶ ^{۱۹}	۱۵ ^{۱۸}	۱۴ ^{۱۷}	۱۳ ^{۱۶}	۱۲ ^{۱۵}			
۲۵ ^{۲۴}	۲۴ ^{۲۳}	۲۳ ^{۲۲}	۲۲ ^{۲۱}	۲۱ ^{۲۰}	۲۰ ^{۱۹}	۱۹ ^{۱۸}			
		۳۰ ^{۲۹}	۲۹ ^{۲۸}	۲۸ ^{۲۷}	۲۷ ^{۲۶}	۲۶ ^{۲۵}			



مانکو مشبک
MANCO MOSHABAK
(W.P 80%)



MOSHABAK
Bisefoon Kermanshah Chemical Complex

مانکوزب (W.P 80%)

مانکوزب قارچ کش حفاظتی مزارع گندم، یونجه و نخود است که از طریق غیرفعال نمودن آنزیم ها و سیستم تنفسی و گروه سولفیدریل در آمینواسید ها منجر به ایجاد اختلال در متابولیسم چربی ها و فرآیند تنفس و در نهایت مرگ آفت می گردد و در پیشگیری از نفوذ عوامل قارچی به داخل نسوج گیاهی و ایجاد بیماری های قارچی استفاده می شود.

میزان مصرف

۲ در هزار
۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار
۲ در هزار و ۵/۰ در هزار روغن

محصول

نخود، یونجه، بادام، مرکبات و گندم
توتون
میخک

Mancozeb (w.p 80%)

Mancozeb is a protective fungicide for wheat, Lucerne and pea farms that through inactivating anzyme, respiratory system and sulfhydryl group in Amino acids leads to disorder in lipids metabolism and respiratory process and finally death of pest and are being used in preventing penetration of fungal agents into plant tissues and the development of fungal diseases.



۲ ^۶ ₂₃	۱ ^۵ ₂₂											
۹ ^{۱۳} ₃₀	۸ ^{۱۲} ₂₉	۷ ^{۱۱} ₂₈	۶ ^{۱۰} ₂₇	۵ ^۹ ₂₆	۴ ^۸ ₂₅	۳ ^۷ ₂₄						
۱۶ ^{۲۰} _{۲۷}	۱۵ ^{۱۹} _{۲۶}	۱۴ ^{۱۸} _{۲۵}	۱۳ ^{۱۷} _{۲۴}	۱۲ ^{۱۶} _{۲۳}	۱۱ ^{۱۵} _{۲۲}	۱۰ ^{۱۴} _{۲۱}						
۲۳ ^{۲۷} _{۳۰}	۲۲ ^{۲۶} _{۲۹}	۲۱ ^{۲۵} _{۲۸}	۲۰ ^{۲۴} _{۲۷}	۱۹ ^{۲۳} _{۲۶}	۱۸ ^{۲۲} _{۲۵}	۱۷ ^{۲۱} _{۲۴}						
۳۰ ^۴ _{۲۰}	۲۹ ^۳ _{۱۹}	۲۸ ^۲ _{۱۸}	۲۷ ^۱ _{۱۷}	۲۶ ^{۲۶} _{۱۶}	۲۵ ^{۲۵} _{۱۵}	۲۴ ^{۲۴} _{۱۴}						



نوع بسته بندی:
قوطی آلومینیوم
نیم و یک لیتری

سایپر متترین
CYPER MOSHABAK
(EC 40%)

MOSHABAK
Bisefoon Kermanshah Chemical Complex

سایپر متترین (EC 40%)

سایپر متترین حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی گوارشی است که با مسدود کردن مسیر ورود سدیم به سلول های عصبی و اختلال در انتقال پالس ها در طول رشته عصبی موجب مرگ حشرات می شود

محصول عنوان آفت میزان مصرف

سیب	آفات چونده	۷۵ میلی لیتر در هزار
پنبه	آفات چونده	۱۷۵ میلی لیتر در هکتار

Cypermethrin (EC 40%)

Cypermethrin is a non systemic insecticide with contact-gastrointestinal effect that blocking path of entrance of sodium to nerve cells and disorder in transferring pulses in nerves leads to death of insects.

08

www.moshabak.co



۷ ^{۱۱} _{۲۷}	۶ ^{۱۶} _{۲۶}	۵ ^۹ _{۲۵}	۴ ^{۲۴} _{۲۴}	۳ ^۷ _{۲۳}	۲ ^{۲۲} _{۲۲}	۱ ^{۲۱} _{۲۱}
۱۴ ^{۱۸} _{۲۸}	۱۳ ^{۱۷} _{۲۷}	۱۲ ^{۱۶} _{۲۶}	۱۱ ^{۱۵} _{۲۵}	۱۰ ^{۱۴} _{۳۰}	۹ ^{۱۳} _{۲۹}	۸ ^{۱۲} _{۲۸}
۲۱ ^{۱۵} _{۳۱}	۲۰ ^{۱۴} _{۳۰}	۱۹ ^{۱۳} _{۲۹}	۱۸ ^{۱۲} _{۲۸}	۱۷ ^{۱۱} _{۲۷}	۱۶ ^{۱۰} _{۲۶}	۱۵ ^۹ _{۲۵}
۲۸ ^{۲۸} _{۳۸}	۲۷ ^{۲۷} _{۳۷}	۲۶ ^{۱۶} _{۳۶}	۲۵ ^{۱۵} _{۳۵}	۲۴ ^{۲۴} _{۳۴}	۲۳ ^{۲۳} _{۳۳}	۲۲ ^{۲۲} _{۳۲}
۳۰ ^{۳۰} _{۳۹} ۲۹ ^{۲۹} _{۳۹}						



هالوکسی فوپ آر متیل مشبک
HALOXYFOP-R-METHYL MOSHABAK
(EC 10.8%)

MOSHABAK
Bisfoon Kermanshah Chemical Complex

هالوکسی فوپ آر متیل (EC 10.8%)

هالوکسی فوپ آر متیل استر علف کشی انتخابی، سیستمیک مزارع چغندر قند، کلزا و پیاز است که از طریق اندام هوایی و برگ گیاه جذب شده و بازدارنده استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز میباشد و مانع رشد بافت‌های مریستمی و اختلال در ساخت غشا، و رشد ریشه و در نهایت موجب مرگ علف‌های هرز باریک برگ میگردد.

میزان مصرف

۰/۷۵ تا ۱ لیتر در هکتار

۰/۶ تا ۰/۷۵ لیتر در هکتار

۰/۵ تا ۰/۷۵ لیتر در هکتار

عنوان آفت

علف هرز کشیده برگ

علف هرز باریک برگ یکساله

علف هرز کشیده برگ

محصول

چغندر قند

پیاز

کلزا

Haloxyfop-R-Methyl (EC 10.8%)

Haloxyfop-R-methyl is a choice systemic herbicide of sugar beet farms, rapeseed plant (COLZA), Onion farms, Soybean farms, which is absorbed through the shoots of herbal leaves and is an inhibitor of ACETYL CO-ANZYM A CARBOXYLASE, causing death of the narrow leaf weeds by barricading growth of MERISTEMATIC tissues and interfering in construction of membranes and development of root and shoots.

09

www.moshabak.co



۵ ^{۱۰}	۴ ^۹	۳ ^۸	۲ ^۷	۱ ^۶
۱۲ ^{۱۷}	۱۱ ^{۱۶}	۱۰ ^{۱۵}	۹ ^{۱۴}	۸ ^{۱۳}
۱۹ ^{۲۴}	۱۸ ^{۲۳}	۱۷ ^{۲۲}	۱۶ ^{۲۱}	۱۵ ^{۲۰}
۲۶ ^{۲۵}	۲۵ ^{۲۴}	۲۴ ^{۲۳}	۲۳ ^{۲۲}	۲۲ ^{۲۱}
۳۰ ^{۲۹}	۲۹ ^{۲۸}	۲۸ ^{۲۷}	۲۷ ^{۲۶}	۲۶ ^{۲۵}



والریت مشبک
VALERATE MOSHABAK
(EC 20%)



فن والریت (EC 20%)

فن والریت حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی گوارشی از گروه پایروتیروئیدی است که با مسدود کردن مسیر ورود سدیم به سلول های عصبی و اختلال در انتقال پالس ها در طول رشته عصبی، حشرات را از بین میبرد. برای مبارزه با آفات پرودینا مزارع چغندر و مینوز لکه گرد درختان میوه استفاده میگردد.

محصول	عنوان آفت	میزان مصرف
چغندر قند	پرودینا	۱ لیتر در هکتار
درختان میوه	مینوز لکه گرد	۰/۵ در هزار

Fenvalerate (EC 20%)

Fenvalerate is a non-systemic insecticide with gastrointestinal contact effects from pyrethroid group which kills insects by blocking the entry of sodium into nerve cells and disrupting pulse transfer along nerve fibers. It is used for controlling cutworms of beet farms and leucoptera scitella of orchard fruits.

10

www.moshabak.co



۳ ^۸ ₂₂	۲ ^۷ ₂₁	۱ ^۶ ₂₀										
۱۵ ^{۱۵} ₂₉	۹ ^{۱۴} ₂₈	۸ ^{۱۳} ₂₇	۷ ^{۱۲} ₂₆	۶ ^{۱۱} ₂₅	۵ ^{۱۰} ₂₄	۴ ^۹ ₂₃						
۱۷ ^{۲۲} _۳	۱۶ ^{۲۱} _۲	۱۵ ^{۲۰} _۱	۱۴ ^{۱۹} ₃₁	۱۳ ^{۱۸} ₃₀	۱۲ ^{۱۷} ₂₉	۱۱ ^{۱۶} ₂₈						
۲۴ ^{۲۹} ₁₂	۲۳ ^{۲۸} ₁₁	۲۲ ^{۲۷} ₁₀	۲۱ ^{۲۶} ₉	۲۰ ^{۲۵} ₈	۱۹ ^{۲۴} ₇	۱۸ ^{۲۳} ₆						
۳۰ ^{۱۸} ₁₈	۲۹ ^{۱۷} ₁₇	۲۸ ^{۱۶} ₁₆	۲۷ ^{۱۵} ₁₅	۲۶ ^{۱۴} ₁₄	۲۵ ^{۱۳} ₁₃							



کلرمتشیک
CHLOR MOSHABAK
(EC 40.8%)

نوع بسته بندی:
قوطی فلزی
یک لیتری

MOSHABAK
Bisefoon Kermanshah Chemical Complex

کلرپیریفوس (EC 40.8%)

کلر پیریفوس حشره کشی غیر سیستمیک و نفوذی با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی (تدخینی) از گروه ارگانو فسفره است که با اختلال در آنزیم استیل کولین استراز و سلولهای عصبی موجب مرگ حشرات میشود برای مبارزه با آفات بالشکها سپردارها، مگس مینوز و کرم طوقه بر استفاده میشود.

میزان مصرف	عنوان آفت	محصول
۱-۱/۵ در هزار با ۵٪ درصد روغن	شپشک ها	درختان میوه
۲-۵/۵ در هزار با ۵٪ درصد روغن	شپشک ها، سپردارها، بالشک ها	مرکبات
۲-۲/۵ در هزار	مینوز برگ	سویا

Chlorpyrifos (EC 40.8%)

Chlorpyrifos is a penetrating non-systemic insecticide with gastrointestinal and respiratory (fumigant) contact effects from organophosphorous group which causes death of insects by interfering in the function of acetylcholine esterase and nerve cells. It is used to control aroliums, peltates, miner flies, and cutworms.

11

www.moshabak.co



1	Y ₁₉											30	20
Λ ₂₆ ^{1F}	V ₂₅ ^{1F}	6 ₂₄ ^{1F}	5 ₂₃ ¹¹	4 ₂₂ ^{1F}	3 ₂₁ ⁹	2 ₂₀ ^{1A}							
15 ₁₂ ^{Y1}	14 ₁₁ ^{Y1}	13 ₁₀ ^{1A}	12 ₉ ^{1A}	11 ₈ ^{1V}	10 ₇ ^{1F}	9 ₆ ^{1D}							
22 ₁₂ ^{Y1}	21 ₁₁ ^{Y1}	20 ₁₀ ^{Y1}	19 ₉ ^{1D}	18 ₈ ^{1F}	17 ₇ ^{Y1}	16 ₆ ^{Y1}							
29 ₁₉ ^{Y1}	28 ₁₈ ^{Y1}	27 ₁₇ ^{Y1}	26 ₁₆ ^{Y1}	25 ₁₅ ^{Y1}	24 ₁₄ ^{Y1}	23 ₁₃ ^{Y1}							



دياز مشبك
DIAZ MOSHABAK
(EC 60%)

نوع بسته بندی:
.....
قوطی فلزی
نیم و یک لیتری

ديازينون (EC 60%)


دبازینون حشره کشی غیر سیستمیک و نفوذی با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی (تدخینی) است که برای مبارزه با آفات شته ها، پسیل ها، شیشک ها، تریپس ها، کرم ها (طوقه بر، ساقه خوار، سفید ریشه) و مگس چغندر و پیاز استفاده می گردد.

محمول	عنوان آفت	میزان مصرف
سیب	کرم سیب	۱ در هزار
گلابی	پسیل گلابی	۱ در هزار
مرکبات	شپشک	۱ در هزار
پسته	شپشک سرشاخه و تنه ای پسته	۱ در هزار
خرما	شپشک های خرما	۲-۱/۵ در هزار
درختان میوه و جنگلی	کرم سفید	۳-۲/۵ لیتر در هزار

Diazinon (EC 60%)

diiazinon is a penetrating non-systemic insecticide with gastrointestinal and respiratory (fumigant) contact effects from organophosphorous group which kills insects by disrupting acetylcholine esterase and nerve cells. It is used for control of plant-louse, psylla, acarid, thrips, worms (cutworm, stem borer, white grub) and beet maggot pests and anion.





توفور دی + ام سی پی آ (SL 67.5%)

توفور دی ام سی پی آ علف کشی هورمونی، انتخابی و سیستمیک می باشد که از طریق برگ و ریشه جذب علف هرز شده و با ایجاد اختلال در رشد و تنفس و فعالیت اکسین باعث از بین بردن علف های هرز پهن برگ میگردد.

میزان مصرف

۱ تا ۲ لیتر در هکتار
از زمان پنجه زنی تا
تشکیل ساقه

عنوان آفت

علفهای هرز پهن برگ

محصول

گندم و جو

توفور دی + ام سی پی آ مشبک
2-4 D+MCPA MOSHABAK
(SL 67.5%)

2-4 D+MCPA (SL 67.5%)

2-4 D +mcpa is a selective and systemic herbicide that is absorbed through the leaf of the weed leaf and can interfere with the growth, respiration and auxin activity of the broadleaf weeds.

13

www.moshabak.co



M O S H A B A K
w w m o s h a b a k . c o



How too Use All Pesticides:

The recommended Pesticides dose is to be fully dissolved in amount of water and, then, poured into the sprayer already filled up to the blade.

While the content of the sprayer tank is being stirred, the rest of the water is poured into it. The sprayer agitator must work during preparation of the toxin solution and, as well, during spraying. The toxin must be sprayed under the pressure of 3-5 bars with particle diameters of 1 to 2 microns. The entire aerial shoot of the pest must be covered with toxin.

طریقه مصرف کلیه آفت کش ها:

میزان توصیه شده از سم را در مقدار کمی آب کاملاً هم بزنید و سپس این محلول را در سمپاش که تا نیمه در آن آب ریخته شده است بریزید. در حالیکه مخزن سمپاش در حال بهم زدن است الباقی آب را به تانک اضافه کنید. همزن سمپاش در زمان تهیه محلول سم و نیز سمپاشی می بایستی کار کند و سم با فشار ۳ تا ۵ بار و با قطرات حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میکرون پاشیده شود. می بایست تمام قسمتهای هوایی آفت با ذرات سم پوشش داده شود.



► **MOSHABAK**
Biseton
Kermanshah
Chemical Complex

کارخانه: کرمانشاه، کیلومتر ۴۵ جاده کرمانشاه روانسر
فکس: ۰۸۳-۴۶۵۶۲۲۴۵ / **تلفن:** ۰۸۳-۴۶۵۶۲۲۴۶-۷
فروش: ۰۸۳-۳۸۲۵۲۳۹۳

Add: 45 Km after Kermanshah to Ravansar city,
Kermanshah – Ravansar Rd , Kermanshah, Iran
Tel: +98-83-46562246-7 / **Fax:** +98-83-46562245
info@moshabak.co **Sale:** +98-83-38252393

www.moshabak.co